



# EnzymoPank®

Diät-Ergänzungsfuttermittel für Hunde und Katzen

## Granuliertes Pulver zum Ausgleich bei unzureichender Verdauung [exokrine Pankreasinsuffizienz]

MIT HOHER  
ENZYM-  
AKTIVITÄT



Bei der exokrinen Pankreasinsuffizienz ist die Verwertung von Fetten, Proteinen und Kohlenhydraten aufgrund unzureichender Produktion von Verdauungsenzymen gestört.

**Schweinepankreas** liefert Verdauungsenzyme (Lipase, Amylase, Protease) mit sehr hoher Aktivität, die eine ausreichende Verdauung der Nahrung gewährleisten.

**Fenchel, Kamille** und **Katzenminze** wirken verdauungsfördernd und entspannen den Darm.



### Wesentliche ernährungsphysiologische Merkmale:

Leicht verdauliche Einzelfuttermittel, niedriger Fettgehalt

### Zusammensetzung:

Schweinepankreas, getrocknet und gemahlen 71%, Maltodextrin, Schweinegelatine, Fenchelsaat 2%, Kamillenblüten, getrocknet 2%, Katzenminze 2%

### Analytische Bestandteile:

Rohprotein	64,9 %	Rohfaser	1 %
Rohfett	4,1 %	Rohasche	6,5 %

### Fütterungsempfehlung:

Zur Verfütterung mit jeder Mahlzeit.

*Bei einem Körpergewicht*

bis	10 kg	pro Mahlzeit	1 Messlöffel
von	> 10–20 kg	pro Mahlzeit	2 Messlöffel
über	20 kg	pro Mahlzeit	3 Messlöffel

[1 Messlöffel = ca. 1,75 ml / 0,7 g]

Bei Bedarf kann die Gabe verdoppelt werden.

Bei längerer Anwendung kann die Gabe in vielen Fällen verringert werden.

### Empfohlene Fütterungsdauer:

Die empfohlene Fütterungsdauer beträgt 3 - 12 Wochen, bei chronischer Insuffizienz der Bauchspeicheldrüse lebenslang.

Es wird empfohlen, vor der Verfütterung den Rat eines Tierarztes einzuholen.

### Hinweise:

Es sollte ein leicht verdauliches Futtermittel mit geringem Fettgehalt verfüttert werden.

Tiere mit exokriner Pankreasinsuffizienz (EPI) sollten 2 - 4 x täglich gefüttert werden.

**EnzymoPank** erst direkt vor der Fütterung jeder Mahlzeit untermischen.

Nicht über 25°C und trocken lagern!

**Haltbarkeit:** 24 Monate

### Handelsform:

100 g Dose

500 g Dose