

Chanox Multi 50 mg/ml Suspension zum Eingeben für Ferkel, Kälber und Lämmer

Wirkstoff: Toltrazuril

Zusammensetzung:

Wirkstoff: Toltrazuril 50,00 mg/ml

Sonstige Bestandteile: Natriumbenzoat (E211), Natriumpropionat (E281)

Anwendungsgebiete:

Ferkel: Zur Vorbeugung von klinischen Symptomen einer Kokzidiose bei Saugferkeln in Betrieben, in denen in der Vergangenheit Kokzidiose, verursacht durch *Isospora suis*, nachgewiesen wurde. *Kälber:* Zur Vorbeugung von klinischen Symptomen einer Kokzidiose und zur Verminderung der Ausscheidung von Kokzidien bei eingestellten Aufzuchtälbern zur Remontierung von Milchkühen, deren Milch für den menschlichen Verzehr bestimmt ist (Milchkühe), in Betrieben, in denen in der Vergangenheit Kokzidiose, verursacht durch *Eimeria bovis* oder *Eimeria zuernii*, nachgewiesen wurde. *Lämmer:* Zur Vorbeugung von klinischen Symptomen einer Kokzidiose und zur Verminderung der Ausscheidung von Kokzidien bei Lämmern in Betrieben, in denen in der Vergangenheit Kokzidiose, verursacht durch *Eimeria crandallii* und *Eimeria ovinoidalis*, nachgewiesen wurde.

Gegenanzeigen:

Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der Hilfsstoffe. Aus Gründen des Umweltschutzes: Nicht anwenden bei Kälbern mit einem Körpergewicht über 80 kg. Nicht anwenden in Masteinheiten bei Mast- und Fleischälbern.

Nebenwirkungen:

Keine bekannt.

Wartezeiten:

Ferkel: Essbare Gewebe: 77 Tage. *Kälber:* Essbare Gewebe: 63 Tage. Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist. *Lämmer:* Essbare Gewebe: 42 Tage. Nicht bei Schafen anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

Verschreibungspflichtig.

Pharmazeutischer Unternehmer:

alfavet Tierarzneimittel GmbH, Leinestr.32, 24539 Neumünster

Stand: 12/2019