



# Clinacin 75 mg Clinacin 150 mg

Tabletten für Hunde

## Clindamycin

### Wirkstoffe und sonstige Bestandteile:

#### Clinacin 75 mg:

1 Tablette enthält:

#### Wirkstoff:

Clindamycin 75 mg [als Clindamycinhydrochlorid]

#### Clinacin 150 mg:

1 Tablette enthält:

#### Wirkstoff:

Clindamycin 150 mg [als Clindamycinhydrochlorid]

#### Sonstige Bestandteile:

Lactose Monohydrat, Povidon, Crospovidon, Mikrokristalline Cellulose, Natriumdodecylsulfat, Hochdisperses Siliciumdioxid und Magnesiumstearat

### Anwendungsgebiete:

Zur Behandlung von:

Infizierten Wunden, Abszessen, Maulhöhlen-/Zahninfektionen, die durch Clindamycin-empfindliche Spezies verursacht wurden oder mit diesen assoziiert sind:

- *Staphylococcus* spp.
- *Streptococcus* spp.
- *Bacteroides* spp.
- *Fusobacterium necrophorum*
- *Clostridium perfringens*

### Osteomyelitis

- *Staphylococcus aureus*

### Gegenanzeigen:

Nicht anwenden bei bekannten Fällen von Überempfindlichkeit gegenüber Clindamycin oder Lincomycin.

Nicht anwenden bei Kaninchen, Hamstern, Meerschweinchen, Chinchillas, Pferden oder Wiederkäuern, da eine Einnahme von Clindamycin bei diesen Tierarten zu schweren Magen-Darm-Störungen führen kann.

### Nebenwirkungen:

Erbrechen und Durchfall werden gelegentlich beobachtet. Clindamycin verursacht gelegentlich ein übermäßiges Wachstum von nicht empfindlichen Organismen, wie resistenten Clostridien und Hefen. Bei einer Superinfektion sollten je nach klinischer Situation entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden.

Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

### Zieltierarten:

Hunde


### Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung:

Zum Eingeben.

*Infizierte Wunden, Abszesse, Maulhöhlen-/Zahninfektionen:*

5,5 mg/kg Clindamycin alle 12 Stunden über 7 – 10 Tage [d.h. 1 Tablette **Clinacin 75 mg** pro 13,5 kg Körpergewicht bzw.

1 Tablette **Clinacin 150 mg** pro 27 kg Körpergewicht zweimal



täglich). Ist innerhalb von 4 Tagen keine Besserung feststellbar, sollte die Empfindlichkeit der pathogenen Keime erneut bestimmt werden.

### Zahn- und periodontale Infektionen:

Bei zahnärztlicher/chirurgischer Behandlung aufgrund einer Zahninfektion kann die Behandlung vor der zahnärztlichen/chirurgischen Behandlung begonnen werden.

### Osteomyelitis:

11 mg/kg Clindamycin alle 12 Stunden mindestens 4 Wochen [d.h. 2 Tabletten **Clinacin 75 mg** pro 13,5 kg Körpergewicht bzw. 2 Tabletten **Clinacin 150 mg** pro 27 kg Körpergewicht zweimal täglich]. Ist innerhalb von 14 Tagen keine Besserung feststellbar, sollte die Empfindlichkeit der pathogenen Keime erneut bestimmt werden.

Die Behandlung mit Clinacin sollte auf dem Ergebnis von Empfindlichkeitsprüfungen basieren.

### Hinweise für die richtige Anwendung:

Entfällt.

### Wartezeit:

Entfällt.

### Besondere Lagerungshinweise:

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Für dieses Veterinärarzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen vorgeschrieben. Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Etikett und dem Karton angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

### Besondere Warnhinweise:

*Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren:*

Während einer anhaltenden Therapie von einem Monat oder länger sollten Leber- und Nierenfunktionstests und Blutkörperchenzählungen durchgeführt werden. Bei Patienten mit schwerer Beeinträchtigung der Nieren- und/oder Leberfunktion in Verbindung mit schweren Stoffwechselstörungen sollte die Verabreichung des Arzneimittels mit Vorsicht erfolgen und die Clindamycintherapie mittels Serumuntersuchung überwacht werden.

*Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender:*

Hände waschen nach Anwendung des Tierarzneimittels. Personen mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Lincosamiden [Lincomycin, Clindamycin] sollten den Umgang mit dem Tierarzneimittel vermeiden.



**Trächtigkeit und Laktation:**

Obwohl Rattenstudien mit hohen Dosierungen nahe gelegt haben, dass Clindamycin keine teratogene Wirkung hat und die Fortpflanzungsfähigkeit von Hunden und Hündinnen nicht wesentlich beeinträchtigt, wurde die Sicherheit während der Trächtigkeit und Laktation oder bei Zuchtrüden bisher nicht nachgewiesen. Deshalb sollte die Verabreichung von Clinacin Tabletten während der Trächtigkeit und Laktation nur nach strenger Nutzen-/Risiko-Einschätzung durch den Tierarzt erfolgen.

**Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen:**

Für Clindamycin wurden neuromuskulär blockierende Eigenschaften nachgewiesen, die möglicherweise die Wirkung anderer neuromuskulär blockierend wirkender Arzneimittel verstärken können. Die gleichzeitige Verwendung solcher Arzneimittel muss vorsichtig erfolgen. Clindamycin sollte nicht gleichzeitig mit Chloramphenicol oder Makrolidpräparaten verabreicht werden, weil ihr Wirkort ebenfalls die 50-S-Untereinheit ist und es eventuell zu antagonistischen Wirkungen kommen kann. Bei gleichzeitiger Verabreichung von Clindamycin und Aminoglykosidantibiotika (z.B. Gentamicin) lassen sich negative Wechselwirkungen (akutes Nierenversagen) nicht vollständig ausschließen.

**Überdosierung (Symptome, Notfallmaßnahmen, Gegenmittel):**

Dosen von 300 mg/kg wurden von Hunden ohne Nebenwirkungen vertragen. Gelegentlich wurden Erbrechen, Appetitlosigkeit, Durchfall, Leukozytose und ein Anstieg von Leberenzymwerten (AST, ALT) beobachtet. In solchen Fällen sollten die Tabletten unverzüglich abgesetzt werden und evtl. eine symptomatische Behandlung der Tiere erfolgen.

**Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Entsorgung von nicht verwendetem Arzneimittel oder von Abfallmaterialien, sofern erforderlich:**

Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammelstellen abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, dass kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann. Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden.

**Zul-Nr:**

**Clinacin 75 mg:** 400531.01.00

**Clinacin 150 mg:** 400531.02.00

**Verschreibungspflichtig.**

**Handelsform:** Dose mit 16 Tabletten



Dosierungstabelle		
Gewicht (kg KGW)	Tabletten 2 x täglich	Bei Osteomyelitis: Tabletten 2x täglich
<b>Clinacin 75 mg</b>		
7	0,5	1
13,5	1	2
20,5	1,5	3
<b>Clinacin 150 mg</b>		
27	1	2
40,5	1,5	3
<b>Clinacin 300 mg</b>		
54	1	2