



# HepatoSan® liquid

Ergänzungsfuttermittel für Rinder



**Schöllkraut** ergänzt die Nahrung mit wertvollen sekundären Pflanzenstoffen.

**Cholin** dient als Ausgangsstoff für die Synthese von Phosphatidylcholin.

**B-Vitamine** aus der Hefe und **Folsäure** sind an zahlreichen Stoffwechselprozessen in der Leber beteiligt.

**DL-Methionin** liefert hochbioaktiven Schwefel und wird für die Bildung von S-Adenosyl-Methionin und Phosphatidylcholin benötigt.

**Bentonit** bindet Mycotoxine wie Aflatoxin B<sub>1</sub>.



**HepatoSan® liquid** liefert wichtige Nährstoffe wie Vitamine, Mineralstoffe, Cholin und Methionin, die insbesondere für die Aufrechterhaltung des Leberstoffwechsels in ausreichender Menge aufgenommen werden müssen. Darüber hinaus sind wohltuende natürliche Aromastoffe (Mariendisteleextrakt, Artischockenextrakt und Curcumaextrakt) und Bentonit enthalten.

#### Zusammensetzung:

Zuckerrübensirup, Bierhefe 3%, Schöllkraut 1%

#### Analytische Bestandteile:

|            |       |              |       |
|------------|-------|--------------|-------|
| Rohprotein | 6,6 % | Rohfaser     | 0 %   |
| Rohfett    | 2,4 % | Rohasche     | 8,6 % |
| Natrium    | 0,1 % | Feuchtigkeit | 71 %  |

#### Zusatzstoffe pro 1000 ml:

##### Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Cholinchlorid                 | 50.000 mg |
| DL-Methionin (technisch rein) | 30.000 mg |
| Folsäure                      | 300 mg    |

##### Aromastoffe:

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Mariendisteleextrakt | 76 ml |
| Artischockenextrakt  | 76 ml |
| Curcumaextrakt       | 76 ml |

##### Technologische Zusatzstoffe:

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Bentonit [1m558] | 20.000 mg |
|------------------|-----------|

#### Fütterungsempfehlung:

Zur Verabreichung über das Futter.

|                     |             |       |
|---------------------|-------------|-------|
| Rinder [500 kg KGW] | 2 x täglich | 50 ml |
|---------------------|-------------|-------|

#### Empfohlene Fütterungsdauer:

Mindestens 10 Tage.

Bei Bedarf kann die Fütterungsdauer unbedenklich verlängert werden.

#### Hinweise:

Die gleichzeitige orale Verabreichung von Makroliden ist zu vermeiden.

Vor Gebrauch schütteln!

Nicht über 25 °C und vor Licht geschützt lagern!  
Nach Anbruch aufbrauchen.

**Haltbarkeit:** 24 Monate

#### Handelsform:

1000 ml Dosierflasche