

Ralcam 20 mg / Ralcam 50 mg Tabletten für Hunde**Wirkstoff:** Carprofen**Zusammensetzung:**Eine Tablette enthält: *Wirkstoff:*

Ralcam 20 mg: Carprofen 20,00 mg

Ralcam 50 mg: Carprofen 50,00 mg

Sonstige Bestandteile:

Ralcam 20mg:

Rotes Eisen(III)-oxid [E172] 0,61 mg

Schwarzes Eisen(II,III)-oxid [E172] 0,38 mg

Ralcam 50mg:

Rotes Eisen(III)-oxid [E172] 1,52 mg

Schwarzes Eisen(II,III)-oxid [E172] 0,95 mg

Anwendungsgebiet(e):

Behandlung von Entzündungs- und Schmerzzuständen bei akuten und chronischen Erkrankungen des Bewegungsapparates (z.B. Osteoarthritis).

Zur Weiterbehandlung postoperativer Schmerzen nach vorangegangener parenteraler Analgesie.

Gegenanzeigen:

Nicht anwenden bei trächtigen oder säugenden Hündinnen, bei Hunden mit schweren Herz-, Leber- oder Nierenerkrankungen sowie bei Hunden mit Verdacht auf gastrointestinale Ulzeration oder Blutungsneigung.

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile.

Nicht anwenden bei dehydrierten, hypovolämischen und hypotonen Tieren.

Nicht gleichzeitig oder innerhalb von 24 Stunden nach einer Vorbehandlung mit anderen NSAIDs oder steroidal Antiphlogistika anwenden.

Nebenwirkungen:

Typische mit NSAIDs assoziierte Nebenwirkungen wie Erbrechen, weiche Fäzes/Diarrhoe, fäkales okkultes Blut (erkennbare Schwarzfärbung des Kotes), Nierenfunktionsstörungen (gesteigerter Durst, erhöhtes oder erniedrigtes Harnvolumen), Appetitverlust und Lethargie wurden beobachtet. Diese Nebenwirkungen treten im Allgemeinen in der ersten Behandlungswoche auf. Sie sind meistens vorübergehender Art und verschwinden nach Beendigung der Behandlung. In sehr seltenen Fällen können sie jedoch sehr schwer oder sogar tödlich sein.

Verschreibungspflichtig.**Pharmazeutischer Unternehmer:**

alfavet Tierarzneimittel GmbH, Leinestr. 32, 24539 Neumünster

Stand: 07/2023